

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース28日間 4回 《開始時基準 PS:0~1 年齢:20~74歳》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—	
プレメディ	プロイマド <sup>®</sup> +5-HT <sub>3</sub> R拮抗剤+テキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分	
①	カルボプラチン:AUC(5) ソルデム3A 200mL	mg	Day1	1時間	
内服	TS-1 : 80mg/m <sup>2</sup> /日 (80, 100, 120mg/日)	mg	Day1夕~ Day15朝	朝・夕 分2	BSA: 1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/日 1.25-1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上→120mg/日
維持療法	4コース終了後、TS-1単剤維持療法開始。1コース:21日間 「カルボプラチン+TS-1併用療法」と合わせて計10ヶ月まで継続する。				
内服	TS-1 : 80mg/m <sup>2</sup> /日 (80, 100, 120mg/日)	mg	Day1夕~ Day15朝	朝・夕 分2	BSA: 1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/日 1.25-1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上→120mg/日
◆カルボプラチン投与量 = AUC × (Ccr+25) Ccr算出: Jelliffeの式					

佐賀大学医学部附属病院