

前治療歴のないstage I -IVA食道腺癌および扁平上皮癌
【食道癌】FOLFOX+放射線併用療法 患者プロトコル

催吐リスク
中等度
放射線併用あり

投与プロトコル 1コース14日間 6回 《開始時基準 PS:0~2 年齢:18歳~》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキーブ	生食500mL	—	—	—	
プレメディ	5-HT3R拮抗剤 + デキサメタゾン + 生食100mL		Day1	30分	
①	エルプラット: 85mg/m ² 5%ブドウ糖 500mL	mg	Day1	2時間	
②	レボホリナート: 200mg/m ² 5%ブドウ糖パック 250mL	mg	Day1	2時間	
★①、②は同時に投与					
③	5-FU(急速): 400mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL	mg	Day1	全開	5-FU:(持続)の投与量に 合わせて、トレフューザー typeT流量換算表より生食 量を算出する。
④	5-FU(持続): 1600mg/m ² 生食 (トレフューザーtypeT流量換算表より算出)	mg mL	Day1	46時間	

- ◆放射線併用: total 50Gy/25Fr
- ◆5-FU持続投与では、トレフューザーtypeT150mLを使用し、3.7ml/Hrにて投与。
- ◆5-FUと生食の比率で流速変化する為、生食投与量はトレフューザーtypeT流量換算表を参照すること。
- ◆治療スケジュール例

↓Cycle 1			↓Cycle 2			↓Cycle 3		
d1-2	d3-5	d8-d12	d15-16	d17-19	d22-d26	d29-30	d31-33	d36-40
CRT	RT	RT	CRT	RT	RT	CRT	RT*	
↓Cycle 4			↓Cycle 5			↓Cycle 6 Evaluation↓		
d43-44			d57-58			d71-72		
CT			CT			CT		

CT = chemotherapy RT = radiotherapy RT* = reduced field radiotherapy

佐賀大学医学部附属病院