

| 投与プロトコール 1クール 21日間 アービタックス:制限なし、シスプラチン+5-FU:6コース 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18-75歳以下》 | | 投与量 | 投与日 | 投与時間 | 備考 |
|--|---|-------------|-----------------|--------------|----|
| ルートKeep | 生食 500mL | — | Day1,2,3,4,8,15 | — | |
| プレメディ | 硫酸マグネシウム20mEq+生食100mL | | Day1 | 1時間 | |
| | ホラミン5mg+5-HT3受容体拮抗薬+プロイメント+デキサメタゾン+生食100mL | | Day1 | 30分 | |
| | デキサメタゾン+生食50mL | | day2,3,4 | 15分 | |
| | ホラミン5mg+デキサメタゾン+生食100mL | | day8,15 | 30分 | |
| ① | アービタックス: 初回: 400mg/m ² 生食(500-アービタックス注入量)mL | 初回 mg | Day1,8,15 | 初回 2時間 | |
| | 2回目以降: 250mg/m ² 生食(250-アービタックス注入量)mL | 2回目以降 mg | | 2回目以降 1時間 | |
| 経過観察 (1時間) | アービタックス投与終了後、ルートキープ用生食でフラッシュ:アービタックスの投与速度と同じ速度(4mL/分)以下で。以降、infusion reactionの発現に注意し、1時間経過観察。 | | | | |
| ② | シスプラチン:*100mg/m ² テルモ生食 200~300mL | mg | Day1 | 2時間 | |
| ③ | 5-FU:*1000mg/m ² 5%ブドウ糖 500mL | mg | Day1,2,3,4 | 24時間 | |
| * シスプラチン、5-FUはfull doseでの投与が困難である場合が多いため、レジメンカレンダーではシスプラチン 80mg/m ² (最大160mg/body)、5-FU 800mg/m ² (最大1600mg/body)で投与量を算出する。 ◆ 6コース終了後も治療を継続する場合は、アービタックスのみの投与を行う。 | | | | | |