

再発または難治性の多発性骨髄腫
 カイプロリス+レブラミド+デキサメタゾン併用療法 患者プロトコール

催吐リスク

軽度

放射線併用なし

投与プロトコール	28日間	18回	投与量	投与日	投与時間	備考	
《開始時基準 PS:制限なし、年齢:18歳以上》							
ルートKeep	5%ブドウ糖液 500mL		—	—	—		
前投薬	レナデックスを併用する日:カイプロリス投与の30分前までにレナデックスを内服						
	レナデックスを併用しない日:カイプロリス投与の30分前までにデカドロン4mgを内服						
①	【1コース day1, 2】 カイプロリス:20mg/m ²		mg	【1-12コース】 day1,2,8,9,15,16	10分 (※)		
	【1コース day1, 2以外】 カイプロリス:27mg/m ²		mg				
	10mg/Vあたり注射用水5mL、 40mg/Vあたり注射用水20mLに溶解後、5%ブドウ糖液100mLに希釈						
内服	レブラミド:25mg/body		mg	day1-21	1日1回		
内服	レナデックス錠:40mg/body		mg	day1,8,15,22(※)	1日1回		
<p>※Infusion reaction予防および対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インフュージョンリアクション予防のため、カイプロリス投与前に下記の前投薬を行う。 ・レナデックスを併用する日:カイプロリス投与の30分前までにレナデックスを内服する。 ・レナデックスを併用しない日:カイプロリス投与の30分前までにデカドロン4mgを内服する。 ・1コース目は、カイプロリス投与後1時間の観察を行う。 <p>◆カイプロリスは体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積2.2m²として投与量を算出する。</p>							

佐賀大学医学部附属病院