

非小細胞肺癌(扁平上皮癌)

キイトルーダ+アブラキサン+カルボプラチン併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース:21日間 4回 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—	
プレメディ	NK1受容体拮抗薬		Day1~		
プレメディ	5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分	
	デキサメタゾン+生食100mL		Day8,15		
①	キイトルーダ: 200mg/body 生食 100mL	mg	Day1	30分	
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュする。				
②	アブラキサン: 100mg/m² 1Vあたり生食20mLで溶解し、必要量を抜き取り、空の点滴バッグ等に注入	mg	Day1,8,15	30分	
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュする。				
③	カルボプラチン: AUC(6) 5%ブドウ糖液 250mL	mg	Day1	1時間	

◆カルボプラチン投与量 = AUC(6) × (Cr+25) Cr算出: Jelliffe式

佐賀大学医学部附属病院