

## 非小細胞肺癌 アリムタ+カルボプラチン5 併用療法 患者プロトコール

中等度

投与プロトコール 1コース 21日間 4回 《開始時基準 PS:0~1 年齢:75歳以下》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生理食塩液	500mL	Day1	—	
プレメディ	NK1R拮抗剤+5HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分	
①	<b>アリムタ 500mg/m<sup>2</sup></b> 生食 100mL	mg	<b>Day1</b>	10分	
②	<b>カルボプラチン AUC(5)</b> 5% ブドウ糖バッグ 250mL	mg	<b>Day1</b>	1時間	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ カルボプラチン投与量 = AUC(5) × (Ccr+25) Ccr算出: Jelliffeの式</li> <li>◆ 初回投与7日以上前から、パンビタン1g/回/日を連日経口投与。 なお、パンビタンの投与を中止又は終了する場合は、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り投与を行う。</li> <li>◆ 初回投与7日以上前に、フレズミンS(1mg/1A)筋肉内投与。(フレズミンSは、以後9週間毎投与)</li> </ul>					

佐賀大学医学部附属病院