

治癒切除不能な進行・再発胃癌  
サイラムザ+アブラキサン併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
軽度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース 28日間 コース制限なし 《開始時基準 PS:0~1、年齢:20歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考	
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1,8,15	—	※day1, 15の前投薬は、サイラムザ投与前に投与する。	
プレメディ	5HT3R拮抗剤(グラネセロン等)+デキサメタゾン +H1ブロッカー(ポラミン等)+生食100mL※		Day1,15	30分		
	デキサメタゾン+生食100mL		Day8			
①	<b>サイラムザ: 8mg/kg</b> 生食(250-サイラムザ投与量)mL	mg	Day1,15	1時間 (注1)		
フラッシュ	サイラムザ投与終了後、ルートキープ用生食でフラッシュを行う。					
②	<b>アブラキサン: 100mg/m<sup>2</sup></b> 1Vあたり生食20mLで溶解し、必要量を抜き取り、空の点滴バッグ等に注入	mg	Day1,8,15	30分		

(注1) サイラムザの投与速度は25mg/分を超えないこと。

佐賀大学医学部附属病院