

胃癌-32

治癒切除不能な進行・再発胃癌

サイラムザ+パクリタキセル併用療法 患者プロトコール

催吐リスク

軽度

放射線併用なし

| 投与プロトコール 1コース 28日間 コース制限なし 《開始時基準 PS:0~2・年齢:20歳以上》 | | 投与量 | 投与日 | 投与時間 | 備考 | |
|---|--|-----|------------------|-------------|----|--|
| ルートKeep | 生食 500mL | — | Day1,8,15 | — | | |
| プレメディ | 5HT3R拮抗剤(グラニセトロン等)+テキサメタゾン+H1(ホラミン等), H2R拮抗剤(ファモチジン等)+生食100mL | | Day1,8,15 | 30分 | | |
| ① | サイラムザ : 8mg/kg ----- 生食(250-サイラムザ投与量)mL | mg | Day1,15 | 1時間 (注1) | | |
| フラッシュ | サイラムザ投与終了後、ルートキープ用生食でフラッシュを行う。 | | | | | |
| ② | パクリタキセル : 80mg/m² ----- 5%ブドウ糖液 250mL | mg | Day1,8,15 | 1時間 | | |

(注1) サイラムザの投与速度は25mg/分を超えないこと。

佐賀大学医学部附属病院