

化学療法未治療の非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)  
 テセントリク+アブラキサン+カルボプラチン併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース:21日間 4-6回 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考	
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1,8,15	—		
①	テセントリク: 1200mg/body 生食 250mL	mg	Day1	※1 下記 参照		
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュする。					
プレメディ (点滴)	NK1R拮抗薬+5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL デキサメタゾン+生食100mL		Day1 Day8,15	30分		
②	アブラキサン: 100mg/m <sup>2</sup> 1Vあたり生食20mLで溶解し、必要量を抜き取り、空の点滴バッグ等に注入	mg	Day1,8,15	30分		
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュする。					
③	カルボプラチン: AUC(6) 5%ブドウ糖液 250mL	mg	Day1	1時間		
※1; テセントリクは、初回60分で投与し、忍容性が良好であれば2回目以降は30分で投与可能。						
◆カルボプラチン投与量 = AUC(6) × (Cr+25) Cr算出: Jelliffe式						

佐賀大学医学部附属病院