

食道癌-14

食道癌

DCF (ドセタキセル+シスプラチン+5-FU) 療法 (JCOG 0807) 患者プロトコール

催吐リスク

高度

放射線併用なし

投与プロトコール 1コース28日間 制限なし 《開始時基準 PS:0~2 年齢:75歳以下》		投与量	投与日	投与時間	備考	
ルートキープ	ソルデム3A 500mL	—	day1,2,3,4,5,15	—		
プレメディ・注射	シスプラチン投与前後に1000~2000mLの適当な輸液を投与し、尿量確保に注意する。 必要に応じて利尿剤を投与する。					
	プロイメンド+5-HT <sub>3</sub> R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分		
	デキサメタゾン+生食100mL		Day2,3,4,5,15	30分		
①	ドセタキセル: 30mg/m <sup>2</sup> 5% ブドウ糖バッグ 250mL	mg	Day1,15	1時間		
②	シスプラチン: 80mg/m <sup>2</sup> 生食バッグ300 mL	mg	Day1	2時間		
③	5-FU: 800mg/m <sup>2</sup> 5% ブドウ糖 500mL	mg	Day1~5	24時間		
側管	ソルデム3A 500mL		Day1~	5時間		
	ラシックス 1/2A(10mg)					
	プリンペラン 1A(10mg)					

佐賀大学医学部附属病院