

投与プロトコール 1コース:21日間 4~6回 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—	
①	テセントリク :1200mg/body	mg	Day1	※1 下記参照	
	生食 250mL				
②	アバスチン :15mg/kg	mg	Day1	※2 下記参照	
	生食 100mL				
プレメディ(内服)	セレスタミン	1錠	Day1	30分前	
プレメディ(注射)	H2R拮抗剤+生食20mL			静注	
プレメディ(点滴)	NK1R拮抗薬+5-HT3R拮抗剤+テキサメタゾン+生食100mL			30分	
③	パクリタキセル :200mg/m ²	mg	Day1	3時間	
	ソルテム3A 500mL				
④	カルボプラチン :AUC(6)	mg	Day1	1時間	
	5%ブドウ糖液 250mL				
※ ₁ テセントリクは、初回60分で投与し、忍容性が良好であれば2回目以降は30分で投与可能。 ※ ₂ アバスチンは、初回90分かけて滴下。問題がなければ2回目:60分、3回目以降:30分に時間短縮可能。 ◆カルボプラチン投与量=AUC(6) × (Cr+25)、 Cr算出:Jelliffeの式					

佐賀大学医学部附属病院