

非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)  
 キイトルーダ+アリムタ+カルボプラチン併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース:21日間 4回 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—	
プレメディ	NK1受容体拮抗薬		Day1~		
プレメディ	5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分	
①	<b>キイトルーダ: 200mg/body</b> 生食 100mL	mg	Day1	30分	
②	<b>アリムタ: 500mg/m<sup>2</sup></b> 生食 100mL	mg	Day1	10分	
③	<b>カルボプラチン: AUC(5)</b> 5%ブドウ糖液 250mL	mg	Day1	60分	
◆アリムタ初回投与7日以上前から1日1回パンピタン1gを連日経口投与。(アリムタ中止3週間後まで) ◆アリムタ初回投与7日以上前に、フレズミンS(1mg/1A)筋肉内投与。以後9週間毎投与。 (アリムタ中止3週間後まで) ◆カルボプラチン投与量 = AUC(5) × (Cr+25) Cr算出: <b>Jelliffe式</b>					

佐賀大学医学部附属病院