

大腸癌-27

進行・再発大腸癌

アバスチン+IRIS(イリノテカン+TS-1)療法

催吐リスク

中等度

放射線併用なし

| 投与プロトコール 1コース28日間 コース制限なし 《開始時基準 PS:0~2 年齢:制限なし》 | | 投与量 | 投与日 | 投与時間 | 備考 |
|---|--|-----|---------|----------|--|
| ルートKeep | 生食 500mL | — | Day1,15 | — | |
| プレメディ | 5-HT ₃ R拮抗剤+デキサメタゾン+生食 100mL | | Day1,15 | 30分 | |
| ① | アバスチン:5mg/kg 生食 100mL | mg | Day1,15 | 使用上の注意参照 | |
| ② | イリノテカン :100mg/m ² 5%ブドウ糖 500mL | mg | Day1,15 | ※90分 | |
| 内服 | TS-1:80, 100, 120mg/日 | mg | Day1-14 | 分2朝・夕 | BSA1.25m ² 未満→80mg/日 BSA1.25~1.5m ² →100mg/日 BSA1.5m ² 以上→120mg/日 |

※アバスチンは、初回90分かけて滴下。問題がなければ2回目:60分、3回目以降:30分に時間短縮可能。

佐賀大学医学部附属病院