

大腸癌-15
 進行・再発 結腸・直腸癌
 アバスチン+XELOX療法 患者プロトコール

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース21日間 コース制限なし 《開始時基準 PS:0~2 年齢:制限なし》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	5%ブドウ糖 500mL	—	Day1	—	
プレメディ	デキサメタゾン+5-HT3R拮抗剤+生食100mL		Day1	30分	
①	アバスチン 7.5mg/kg 生食 100ml	mg	Day1	使用上の注意参照	
②	エルプラット: 130mg/m ² 5%ブドウ糖 500mL	mg	Day1	2時間	
内服	ゼローダ(300mg/錠): 2000mg/m ² /day BSA 1.36m ² 未満: 2400mg(8錠)/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満: 3000mg(10錠)/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満: 3600mg(12錠)/day 1.96m ² 以上: 4200mg(14錠)/day	mg (錠)/day	Day1 夕~ Day15 朝	分2 朝夕	

◆アバスチンは、初回90分かけて滴下。問題がなければ2回目:60分、3回目以降:30分に時間短縮可能。

佐賀大学医学部附属病院