

**尿路上皮癌（膀胱癌、腎盂・尿管癌）  
ジェムザール+シスプラチニ併用療法 患者プロトコール**

催吐リスク
<b>高度</b>
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース 28日間 6回 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
<b>内服・プレメディ</b>		イメンド Day2:125mg/day、Day3,4～:80mg/day	day2,3,4～	—	
ルートキープ	生食	500mL	Day1,2,8,15		
ハイドレーション	ソルアセトF	500mL	Day2	2時間	
<b>プレメディ</b>	デキサメタゾン+生食100mL	—	Day1,8,15	30分	
	5-HT3R拮抗薬+デキサメタゾン+生食100mL		Day2	30分	
<b>①</b>	<b>ジェムザール 1000mg/m<sup>2</sup></b>	mg	<b>Day1,8,15</b>	30分	
	5%ブドウ糖 100mL				
ハイドレーション	マンニトール20%	200mL	Day2	30分	
<b>②</b>	<b>シスプラチニ 70mg/m<sup>2</sup></b>	mg	<b>Day2</b>	2時間	
	テルパック生食 300mL				
ハイドレーション	ソルアセトF	500mL	Day2	2時間	
ハイドレーション	ソルデム3A	500mL	Day2	2時間	

佐賀大学医学部附属病院