

投与プロトコール		投与量	投与日	投与時間	備考	
コース14日間 コース制限なし 《開始時基準 PS:0~2 年齢:18歳~75歳》						
ルートキープ	生食500mL	—	—	—	5-FU:(持続)の投与量に 合せて、トレフューザー typeT流量換算表より生 食量を算出する。	
プレメディ	5-HT3R拮抗剤 + デキサメタゾン + 生食100mL		Day1	30分		
①	イリノテカン: 150mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖 500mL	mg	Day1	2時間		
②	レボホリナート: 200mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖バック 250mL	mg	Day1	2時間		
★①・②は、同時に投与						
③	5-FU:(急速)400mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖 100mL	mg	Day1	全開		
④	5-FU:(持続)2400mg/m <sup>2</sup> 生食 (トレフューザーtypeT流量換算表より算出)	mg mL	Day1	46時間		
◆5-FU持続投与では、トレフューザーtypeT150mLを使用し、3.7ml/Hrにて投与。						
◆5-FUと生食の比率で流速変化する為、生食投与量はトレフューザーtypeT流量換算表を参照すること。						

佐賀大学医学部附属病院