

子宮体癌 DP:ドセタキセル+シスプラチン療法JGOG2043 患者プロトコール

投与プロトコール 1コース 3週間 6回 《開始時基準 PS:0~2 年齢:20歳以上75歳未満》		投与量	投与日	投与時間	備考
プレメディ・内服	イメンド Day1:125mg/day、Day2,3~:80mg/day		Day1,2,3~		
ルートKeep	生食	500mL	Day1	—	
ハイドレーション	ソルアセトF	500mL		2時間	
プレメディ	5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン9.9mg + 生食100ml		Day1	30分	
	デキサメタゾン6.6mg + 生食100ml		Day2	30分	
①	ドセタキセル: 70mg/m ² 5% ブドウ糖ハック 250mL	mg	Day1	1時間	
②	シスプラチン: 60mg/m ² 生食テルパック 300mL	mg	Day1	2時間	
ハイドレーション	ソルデム3A	500mL	Day1	2時間	
	マンニトール	200mL	Day1	1時間	
	ソルアセトF	500mL	Day1	2時間	
	ソルデム3A	500mL	Day1	2時間	
	ソルアセトF	1000mL	翌朝まで	12時間	
ポストメディ	デカドロン錠(0.5mg/錠)	16錠	day3~3日間	分2 朝夕食後	
◆ +/-5kgを超える体重変動が見られた場合は、再度体表面積およびCcrを計算して投与量を決定する。					

佐賀大学医学部附属病院