

大腸癌-42

切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌  
 アバスチン+ロンサーフ併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール <b>1コース28日間 PDまで</b> 《開始時基準 PS:0~1、年齢:20歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1,15	—	※患者の状態に応じて、制吐剤の投与を検討する。
①	<b>アバスチン: 5mg/kg</b> 生食 100ml	mg	Day1,15	使用上の注意参照	
内服	<b>ロンサーフ</b> <b>35mg/m<sup>2</sup>/回 × 2回/日</b> BSA 1.07m <sup>2</sup> 未満: 35mg/回(70mg/日) 1.07m <sup>2</sup> 以上1.23m <sup>2</sup> 未満: 40mg/回(80mg/日) 1.23m <sup>2</sup> 以上1.38m <sup>2</sup> 未満: 45mg/回(90mg/日) 1.38m <sup>2</sup> 以上1.53m <sup>2</sup> 未満: 50mg/回(100mg/日) 1.53m <sup>2</sup> 以上1.69m <sup>2</sup> 未満: 55mg/回(110mg/日) 1.69m <sup>2</sup> 以上1.84m <sup>2</sup> 未満: 60mg/回(120mg/日) 1.84m <sup>2</sup> 以上1.99m <sup>2</sup> 未満: 65mg/回(130mg/日) 1.99m <sup>2</sup> 以上2.15m <sup>2</sup> 未満: 70mg/回(140mg/日) 2.15m <sup>2</sup> 以上: 75mg/回(150mg/日)	mg/回 (mg/日)	Day1夕-Day6朝, Day8夕-Day13朝	分2朝夕 食後	
◆アバスチンは、初回90分かけて滴下。問題がなければ2回目:60分、3回目以降:30分に時間短縮可能。 ◆ロンサーフは、空腹時投与を避け、食後に服用する。(空腹時投与では、食後投与と比較して、トリフルリジンの最高血中濃度が上昇するため) ◆ロンサーフ 50mg/日を投与する場合は、朝食後に20mgを、夕食後に30mgを投与する。					

佐賀大学医学部附属病院