

投与プロトコール 1コース 21日間 6回 《開始時基準 PS:0~2 20歳以上75歳以下》		投与量	投与日	投与時間	備考
プレメディ・内服	イメンド Day1:125mg/day、Day2,3~:80mg/day		Day1,2,3~		
ルートKeep	生食 500ml	—	Day1	—	
ハイドレーション	ソルアセトF	500mL	Day1	2時間	
プレメディ	5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン9.9mg+生食100mL		Day1	30分	
	デキサメタゾン6.6mg+生食100mL		Day2		
①	<b>ドキシソルピシン : 60mg/m<sup>2</sup></b> 生食50mL	mg	Day1	全開で	
②	<b>シスプラチン : 50mg/m<sup>2</sup></b> 生食テルパック 300mL	mg	Day1	2時間	
ハイドレーション	ソルデム3A	500mL	Day1	2時間	
	マンニトール	200mL	Day1	1時間	
	ソルアセトF	500mL	Day1	2時間	
	ソルデム3A	500mL	Day1	2時間	
	ソルアセトF	1000mL	翌朝まで	12時間	
ポストメディ	デカドロン錠 (0.5mg/錠)	16錠	day3~3日間	分2 朝夕食後	

◆ +/-5kgを超える体重変動が見られた場合は、再度体表面積およびCcrを計算して投与量を決定する。

佐賀大学医学部附属病院