

催吐リスク
中等度-高度
放射線併用なし

投与プロトコール	投与量	投与日	投与時間	備考
1コース 14日間 12回 《開始時基準 PS:0~2 年齢:20歳以上》				
プレメディ・内服	* イメンド Day1: 125mg/day、Day2,3~: 80mg/day	Day1,2,3~	—	* イメンドは必要に応じて投与する。
ルートKeep	生食 500mL	Day1	—	
ハイドレーション	ソルデム3A 500mL	Day1	90分	
プレメディ	5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL	Day1	30分	
①	シスプラチン: 25mg/m2 生食 250mL	mg	Day1 1時間	
②	ジェムザール: 1000mg/m2 5%ブドウ糖 100mL	mg	Day1 30分	
フラッシュ	ルートキープ用の生食は、ハイドレーション、ジェムザール後のフラッシュも兼ねて全量投与。			
内服	TS-1: 80、100、120mg/日	mg	Day1,2,3,4,5, 6,7 分2 朝夕	BSA1.25㎡未満→80mg/日 BSA1.25~1.50㎡→100mg/日 BSA1.50㎡以上→120mg/日
※ Ccrが45以上60mL/min未満の場合は、TS-1を1段階減量して開始する。				

佐賀大学医学部附属病院