

進展型小細胞肺癌(1st line)

中等度

イミフィンジ+カルボプラチン+エトポシド併用療法 患者プロトコール

放射線併用なし

投与プロトコール 1コース 21日間 4回 《開始時基準 PS:0~1 年齢:20歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500ml		—		
①	イミフィンジ :1500mg/body	mg	Day1	1時間	
	□ 体重30kg以下:20mg/kg				
	生食 100mL				
イミフィンジ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ 初回はイミフィンジ投与後60分間の観察期間を設ける。問題なければ2回目以降は30分間に短縮可能。 観察期間中もプレメディ、ハイドレーションは投与可能とする(抗癌剤は投与しない)					
プレメディ	NK1受容体拮抗薬		day1~		
	5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		day1	30分	
	デキサメタゾン+生食100mL		day2,3	30分	
②	カルボプラチン AUC(5)	mg	Day1	1時間	
	5%ブドウ糖 250mL				
③	エトポシド 100mg/m ²	mg	Day1,2,3	2時間	
	5%ブドウ糖 500mL				
◆カルボプラチン投与量 = AUC(5) × (Cr+25) Cr算出:Jelliffeの式					

佐賀大学医学部附属病院