

小細胞肺癌-14

進展型小細胞肺癌 (1st line)

イミフィンジ+エトボシド+シスプラチニ併用療法 患者プロトコール

催吐リスク

高度

放射線併用なし

投与プロトコール 1コース21日間 4回 《開始時基準 PS:0~1年齢:20歳以上70歳以下》		投与量	投与日	投与時間	備考	
①	ルートKeep 生食 500ml	mg	—		イミフィンジ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ 初回はイミフィンジ投与後60分間の観察期間を設ける。問題なければ2回目以降は30分間に短縮可能。 観察期間中もプレメディ、ハイドレーションは投与可能とする(抗癌剤は投与しない)	
	イミフィンジ: 1500mg/body		Day1	1時間		
	□ 体重30kg以下: 20mg/kg					
	生食 100mL					
プレメディ	硫酸マグネシウム8mEq+生食100mL	mg	Day1	30分	Day1 Day1 Day2,3	
	プロイメント+5HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分		
	デキサメタゾン+生食100mL		Day2,3	30分		
②	エトボシド 100mg/m <sup>2</sup>	mg	Day1,2,3	2時間	5%ブドウ糖液 500mL	
	5%ブドウ糖液 500mL					
③	シスプラチニ 80mg/m <sup>2</sup>	mg	Day1	2時間	生食 300mL	
	生食 300mL					

佐賀大学医学部附属病院