

非小細胞肺癌-68

化学療法未治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌  
 (オブジーボ+ヤーボイ+化学療法併用療法後の維持療法にも用いる)  
 オブジーボ+ヤーボイ併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
最小度
放射線併用なし

投与プロトコール <b>1コース:42日間 投与期間:2年間</b> 《開始時基準 PS:0~1、年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考	
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1,22	—		
①	<b>オブジーボ: 360mg/body</b> 生食 100mL	mg	<b>Day1,22</b>	30分		
オブジーボ投与終了後30分以上経過してヤーボイの投与を開始する						
②	<b>ヤーボイ: 1mg/kg</b> 生食20mL 最終濃度1~4mg/mLとなるように調製	mg	<b>Day1</b>	30分		
◆オブジーボ投与時の総液量は、体重30kg以上の患者では総液量を150mL以下とする。 ※体重30kg未満の患者では、総液量を100mL以下とするため、生食50mL(100mLボトル)に希釈する。 ◆ヤーボイは最終濃度1~4mg/mLとなるように調製する。体重25kg未満の患者の場合は、生食量に注意が必要。						

佐賀大学医学部附属病院