

胃癌-50

化学療法歴のない・HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌  
**オプジーボ+SOX療法 患者プロトコール**

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース21日間 コース数:制限なし 《開始時基準 PS:0~1 年齢:20歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	5%ブドウ糖 500mL	—	Day1	—	※オプジーボと5%ブドウ糖液の配合変化は問題ないことを確認済
①	オプジーボ: 360mg/body 生食100mL	mg	day1	30分	
フラッシュ	ルートキープ用輸液でフラッシュする				
プレメディ	デキサメタゾン+5-HT3R拮抗剤+生食100mL		Day1	30分	※NK1受容体拮抗薬投与については患者毎に検討
②	エルプラット: 130mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖 500mL	mg	Day1	2時間	
内服	S-1: 80, 100, 120mg/日	mg/日	Day1夕~ Day15朝	分2 朝夕	BSA1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/日 BSA1.25~1.5m <sup>2</sup> →100mg/日 BSA1.5m <sup>2</sup> 以上→120mg/日

◆オプジーボ投与時の総液量は、体重30kg以上の患者では総液量を150mL以下とする。  
 ※体重30kg未満の患者では、総液量を100mL以下とするため、生食50mL(生食100mLボトル)に希釈する。

佐賀大学医学部附属病院