

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の

手術不能又は再発乳癌

【6週間隔】キイトルーダ+ジェムザール+カルボプラチニ併用療法 患者プロトコール

投与プロトコール 1コース:42日間 キイトルーダ:18回、化学療法:制限なし 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1,8,22,29	—	NK1受容体拮抗薬は必須としない
①	キイトルーダ:400mg/body 生食 100mL	mg	Day1	30分	
フラッシュ	キイトルーダ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ				
プレメディ(点滴)	5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1,8,22,29	30分	
②	ジェムザール:1000mg/m ² 5%ブドウ糖液 100mL	mg	Day1,8,22,29	30分	
③	カルボプラチニ:AUC(2) 5%ブドウ糖液 250mL	mg	Day1,8,22,29	60分	

◆カルボプラチニ投与量 = AUC(2) × (Ccr+25) Ccr算出:Cockcroft-Gault式

佐賀大学医学部附属病院