

乳癌-50

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の
手術不能又は再発乳癌

【6週間隔】キイトルーダ＋パクリタキセル併用療法

| |
|---------|
| 催吐リスク |
| 軽度 |
| 放射線併用なし |

| 投与プロトコール 1コース:84日間 キイトルーダ:18回、化学療法:制限なし 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》 | | 投与量 | 投与日 | 投与時間 | 備考 | |
|---|----------------------------------|-----|-----------------------------------|------|----|--|
| ルートKeep | 生食 500ml | - | Day1,8,15, 29,36,43,57,64,71 | - | | |
| ① | キイトルーダ:400mg/body 生食 100mL | mg | Day1,43 | 30分 | | |
| キイトルーダ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ | | | | | | |
| プレメディ | セレスタミン | | Day1,8,15, 29,36,43,57,64,71 | 30分前 | | |
| | 5-HT3R拮抗剤＋デキサメタゾン＋H2R拮抗薬＋生食100mL | | Day1,8,15, 29,36,43,57,64,71 | 30分 | | |
| ② | パクリタキセル:90mg/m ² | mg | Day1,8,15 29,36,43 57,64,71 | 60分 | | |
| | 5%ブドウ糖液 250mL | | | | | |

佐賀大学医学部附属病院