

非小細胞肺癌-72

化学療法未治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(扁平上皮癌)  
 キイトルーダ+パクリタキセル+カルボプラチン併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
<b>中等度</b>
放射線併用なし

投与プロトコール <b>1コース:21日間 コース数:4回</b> 《開始時基準 PS:0~1、年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—	
①	<b>キイトルーダ:200mg/body</b> 生食 100mL	mg	<b>Day1</b>	30分	
フラッシュ	キイトルーダ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ				
プレメディ(内服)	セレスタミン	1錠	Day1	30分前	
プレメディ(注射)	H2R拮抗剤+生食20mL		Day1	30分前	静注
プレメディ(点滴)	NK1-R拮抗剤+5-HT3R拮抗剤+テキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分	
②	<b>パクリタキセル:200mg/m<sup>2</sup></b> 生食 500mL	mg	<b>Day1</b>	3時間	
③	<b>カルボプラチン:AUC(6)</b> 5%ブドウ糖液 250mL	mg	<b>Day1</b>	1時間	

◆カルボプラチン投与量 = AUC(6) × (Ccr+25) Ccr算出:**Jelliffe式**

佐賀大学医学部附属病院