

## CD20陽性 悪性リンパ腫(□R-CHOP/□R-THP-COP)療法

投与プロトコール 1コース 21日間 8回 《開始時基準 PS:0~2 年齢:制限なし》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	ソルデム3A 500mL	500mL	Day1,3	—	
プレメディ/内服	抗ヒスタミン剤 + アセトアミノフェン	—	Day1	30分前	
①	<input type="checkbox"/> リツキサン <input type="checkbox"/> リツキシマブBS 375mg/m <sup>2</sup> 生食または5%ブドウ糖で1mg/mL以下の濃度に調製	mg	Day1	添付文書参照	
プレメディ	5-HT <sub>3</sub> 受容体拮抗薬 + 生食50mL		Day3 (Day1)	30分	
②	エンドキサン : 750mg/m <sup>2</sup> 生食 500mL	mg	Day3 (Day1)	2時間	
③	オンコピン : 1.4mg/m <sup>2</sup> 生食で0.1mg/mLの濃度に調製	mg	Day3 (Day1)	1分程度で静注	最大 2mg/bodyまで
④	<input type="checkbox"/> ドキソルピシン: 50mg/m <sup>2</sup> または <input type="checkbox"/> テラルピシン: 50mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 100mL	mg	Day3 (Day1)	30分	
内服	プレートニゾロン: 100mg/body	mg	Day3-7 (Day1-5)	—	
◆リツキサン(リツキシマブBS)は1mg/mL以下の濃度で投与を行う。また、投与24時間以内に現れやすいinfusion reaction (発熱、悪寒、頭痛等)を軽減させるため、投与の30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤等の前投与が必要。 ◆リツキサン(リツキシマブBS)以外の薬剤は、年齢に応じて適宜減量を検討する。					

佐賀大学医学部附属病院