

投与プロトコール		投与量	投与日	投与時間	備考
1コース:28日間 コース数:制限無し 《開始時基準 PS:0~3 18歳以上》					
ルートKeep	生食 500mL (ビダーザ点滴静注時)	-	Day1-7	-	※1 ビダーザは原則皮下投与を行う。 出血傾向等により皮下投与が 困難な場合は点滴静注も可能。 点滴静注の場合は、 1バイアルを注射用水10mLで溶解し、 生食50mLに混合して10分で投与。
プレメディ	5-HT3R拮抗剤(内服)		Day1-7	-	
①	<b>ビダーザ:75mg/m<sup>2</sup></b> 皮下注射: 1バイアルを注射用水4mLで溶解	mg	Day1-7	※1 原則 皮下 注射	※2 併用薬のCYP3Aの阻害強度別で 用量が異なるため注意 (添付文書参照)
内服	<b>ベネクレスト ※2</b> 【1コース目】 Day1:100mg/body/日	mg	Day1	分1 食後	
	Day2:200mg/body/日	mg	Day2		
	Day3-28:400mg/body/日	mg	Day3-28		
	【2コース目以降】 400mg/body/日	mg	Day1-28		
◆ベネクレストは主にCYP3Aにより代謝される。またP糖タンパク(P-gp)の基質であり、P-gpを阻害する。 相互作用に注意が必要な薬剤であり、詳細は添付文書を参照すること。					
◆国内ガイドラインにおいて、催吐リスクはビダーザ:中等度、ベネクレスト:軽度に分類される。 制吐療法は5-HT3受容体拮抗薬のみとする。必要に応じて患者毎に制吐薬を検討すること。					