

**CD20陽性の濾胞性リンパ腫
ガザイバ + 【点滴静注液】トリアキシン併用療法**

催吐リスク

中等度

放射線併用なし

投与プロトコール 1コース 28日間 6回 《開始時基準 PS:0~2 年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
1コース目					
ルートKeep	生食	500mL	Day1,2,3,8,15	-	
プレメディ/内服	*1) プレドニゾン100mg + 抗ヒスタミン剤 + 解熱鎮痛剤 抗ヒスタミン剤 + 解熱鎮痛剤		Day1 Day8,15	1時間前 30分前	*1) 1コース目 day1は、 ガザイバ投与1時間前ま でに副腎皮質ホルモン剤 (プレドニゾン100mg等) の前投与が必須。 (ヒドロコルチゾンはIRの 軽減に有効ではない)
①	ガザイバ:1000mg/body 生食210mL	mg	Day1,8,15	添付文書 参照	
プレメディ	5-HT3受容体拮抗薬+デキサメタゾン+生食100mL		Day2,3	30分	
②	トリアキシン :90mg/m ² <input type="checkbox"/> 生食 50mL <input type="checkbox"/> 生食 (250-トリアキシン注入量)mL	mg	Day2,3	トリアキシンの投与時間に応じて、 以下の通り希釈すること 10分 1時間	
2-6コース目					
ルートKeep	生食	500mL	Day1,2,3	-	
プレメディ/内服	抗ヒスタミン剤 + 解熱鎮痛剤		Day1	30分前	*2) 外来では、トリアキシンを Day1,2で投与可
①	ガザイバ:1000mg/body 生食210mL	mg	Day1	添付文書 参照	
プレメディ	5-HT3受容体拮抗薬+デキサメタゾン+生食100mL		Day2,3*2)	30分	
②	トリアキシン :90mg/m ² <input type="checkbox"/> 生食 50mL <input type="checkbox"/> 生食 (250-トリアキシン注入量)mL	mg	Day2,3*2)	トリアキシンの投与時間に応じて、 以下の通り希釈すること 10分 1時間	

佐賀大学医学部附属病院