

CD20陽性再発・難治性

低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫・マントル細胞リンパ腫

リツキサン(リツキシマブBS) + 90mg/m²【点滴静注液】トリアキシン(R-Benda)療法

投与プロトコール 1コース 28日間 4-6回 《開始時基準 PS:0~2 年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食	500mL	Day1,2,3	-	
プレメディ/内服	抗ヒスタミン剤 + アセトアミノフェン		Day1	30分前	
①	<input type="checkbox"/> リツキサン	mg	Day1	添付文書参照	
	<input type="checkbox"/> リツキシマブBS 375mg/m ² 生食で1mg/mL以下の濃度に調製				
プレメディ	5-HT3受容体拮抗薬+デキサメタゾン+生食100mL		Day2,3	30分	
②	トリアキシン :90mg/m ²	mg	Day2,3	トリアキシンの投与時間に応じて、以下の通り希釈すること	
	<input type="checkbox"/> 生食 50mL			10分	※外来では、トリアキシンを Day 1,2で投与可
	<input type="checkbox"/> 生食(250-トリアキシン注入量)mL			1時間	

◆リツキサン(リツキシマブBS)は1mg/mL以下の濃度で投与を行う。また、投与24時間以内に現れやすいinfusion reaction(発熱、悪寒、頭痛等)を軽減させるため、投与の30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤等の前投与が必要。

佐賀大学医学部附属病院