

非小細胞肺癌-74

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
 イジユド+イミフィンジ維持療法 患者プロトコール
 (イジユド+イミフィンジ+化学療法併用療法に続いて)

催吐リスク
最小度
放射線併用なし

投与プロトコール		投与量	投与日	投与時間	備考	
コース期間: 下記参照 コース数: 制限なし 《開始時基準 PS: 0~1、年齢: 20歳以上》						
1コース目(1コース: 56日間)						
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1,29	—		
①	イジユド: 75mg/body 生食 100mL	mg	Day29	60分		
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュする。					
②	イミフィンジ: 1500mg/body <input type="checkbox"/> 体重30kg以下: 20mg/kg 生食 100mL	mg	Day1,29	60分		
2コース目以降(1コース: 28日間)						
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—		
①	イミフィンジ: 1500mg/body <input type="checkbox"/> 体重30kg以下: 20mg/kg 生食 100mL	mg	Day1	60分		
◆本プロトコールは、イジユド+イミフィンジ+化学療法併用療法後の維持療法として使用する。						

佐賀大学医学部附属病院