

非小細胞肺癌-77

非小細胞肺癌における術前補助療法(扁平上皮癌)

【術前補助】オプジーボ+ジェムザール+カルボプラチン併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース:21日間 コース数:最大3回 《開始時基準 PS:0~1、年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1,8	—	
①	オプジーボ:360mg/body	mg	Day1	30分	
	生食 100mL				
フラッシュ	オプジーボ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ				
プレメディ(点滴)	NK1-R拮抗剤+5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分	
プレメディ(点滴)	デキサメタゾン+生食100mL		Day8	30分	
②	ジェムザール:1000mg/m²	mg	Day1,8	30分	
	5%ブドウ糖液 100mL				
③	カルボプラチン:AUC(5)	mg	Day1	1時間	
	5%ブドウ糖液 250mL				
◆オプジーボ投与時の総液量は、体重30kg以上の患者では総液量を150mL以下とする。 ◆オプジーボ投与時の総液量は、体重30kg以上の患者では総液量を150mL以下とする。 ※体重30kg未満の患者では、総液量を100mL以下とするため、生食50mL(100mLボトル)に希釈する。 ◆カルボプラチン投与量 = AUC(5) × (Cr+25) Cr算出: Cockcroft-Gault式					

佐賀大学医学部附属病院