

HER-2陽性乳癌 トラスツズマブBS(ハーセプチン) + ロゼウス(VNR)療法 患者プロトコル

投与プロトコル 1コース21日間 制限なし 《開始時基準 PS:0~2 年齢:75歳以下》		投与量	投与日	投与時間	備考			
ルートKeep	生食 500ml	—	Day1,8,15	—				
①	ロゼウス 20~25mg/m ²	mg	Day1,8	5分				
	生食 50mL							
ルートキープ用生食でフラッシュ								
②	初回	<input type="checkbox"/> トラスツズマブBS:4mg/kg	mg	Day1,8,15		90分		
		<input type="checkbox"/> (ハーセプチン:4mg/kg)						
		60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注						
	2回目以降	<input type="checkbox"/> トラスツズマブBS:2mg/kg					mg	下記参照
		<input type="checkbox"/> (ハーセプチン:2mg/kg)						
		60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注						
生食 250mL								

Day1投与Day8スキップ,Day15投与後1週間休薬(1コース28日)、Day1,8投与後2週間休薬(1コース28日)等の変則も可能とする。

- ◆トラスツズマブ(ハーセプチン)は初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる。
- ◆ロゼウスの1回投与量は25mg/m²以下となるようにする。
- ◆ロゼウスの投与時間は10分以内とする。

佐賀大学医学部附属病院