

非小細胞肺癌-75

非小細胞肺癌における術前補助療法

【術前補助】オプジーボ+パクリタキセル+カルボプラチン併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース:21日間 コース数:最大3回 《開始時基準 PS:0~1、年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—	
①	オプジーボ:360mg/body	mg	Day1	30分	
	生食 100mL				
フラッシュ	オプジーボ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ				
プレメディ(内服)	セレスタミン	1錠	Day1	30分前	静注
プレメディ(注射)	H2R拮抗剤+生食20mL		Day1	30分前	
プレメディ(点滴)	NK1-R拮抗剤+5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分	
②	パクリタキセル:175mg/m²	mg	Day1	3時間	
	ソルデム3A 500mL				
③	カルボプラチン:AUC(5)	mg	Day1	1時間	
	5%ブドウ糖液 250mL				
<p>◆オプジーボ投与時の総液量は、体重30kg以上の患者では総液量を150mL以下とする。</p> <p>◆オプジーボ投与時の総液量は、体重30kg以上の患者では総液量を150mL以下とする。</p> <p>※体重30kg未満の患者では、総液量を100mL以下とするため、生食50mL(100mLボトル)に希釈する。</p> <p>◆カルボプラチン投与量 = AUC(5) × (Ccr+25) Ccr算出:Cockcroft-Gault式</p>					

佐賀大学医学部附属病院