

投与プロトコル 1コース 21日間 4回 《開始時基準 PS:0~2 年齢:制限なし》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—	※患者毎に必要な応じて5-HT ₃ R拮抗薬の投与を検討する。
プレメディ	デキサメタゾン+生食100mL(※)		Day1	30分	
フラッシュ	アブラキサン投与前後にルートキープ用生食でフラッシュを行う。				
①	アブラキサン :260mg/m² 1Vあたり生食20mLで溶解し、必要量を抜き取り、空の点滴バッグ等に注入	mg	Day1	30分	
②	初回 <input type="checkbox"/> トラスツズマブBS:8mg/kg <input type="checkbox"/> (ハーセプチン:8mg/kg) 60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注 生食 250mL	mg	Day1	90分	
	2回目以降 <input type="checkbox"/> トラスツズマブBS:6mg/kg <input type="checkbox"/> (ハーセプチン:6mg/kg) 60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注 生食 250mL	mg	Day1	下記参照	

◆トラスツズマブ(ハーセプチン)は初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる。

佐賀大学医学部附属病院