

## HER-2陽性乳癌 トラスツズマブBS(ハーセプチン) + パクリタキセル療法 患者プロトコール

軽度

投与プロトコール 1コース 28日間 制限なし 《開始時基準 PS:0~2 75歳以下》		投与量	投与日	投与時間	備考
プレメディ(内服)	セレスタミン	1錠	Day1,8,15	30分前	
ルートKeep	生食 500ml	-	Day1,8,15,22	-	
プレメディ(点滴)	5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+H2R拮抗剤+生食100mL		Day1,8,15	30分	
①	<b>パクリタキセル :80mg/m<sup>2</sup></b> 5%ブドウ糖バッグ 250mL	mg	<b>Day1,8,15</b>	1時間以上	
②	<b>初回</b> <input type="checkbox"/> <b>トラスツズマブBS:4mg/kg</b> <input type="checkbox"/> <b>(ハーセプチン:4mg/kg)</b> 60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注 生食 250mL	mg	<b>Day 1,8,15,22</b>	90分	
	<b>2回目以降</b> <input type="checkbox"/> <b>トラスツズマブBS:2mg/kg</b> <input type="checkbox"/> <b>(ハーセプチン:2mg/kg)</b> 60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注 生食 250mL	mg		下記参照	

◆トラスツズマブ(ハーセプチン)は初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる。

佐賀大学医学部附属病院