

HER-2 陽性乳癌(進行・再発、術前・術後補助療法)  
 トラスツズマブBS(ハーセプチン)+ドセタキセル+カルボプラチン療法  
 患者プロトコール

投与プロトコール 1コース 21日間 進行再発:8回、術前・術後補助療法:6回 《開始時基準 PS:0~2 18~75歳》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500ml	-	Day1	-	
①	初回	<input type="checkbox"/> トラスツズマブBS:8mg/kg <input type="checkbox"/> (ハーセプチン:8mg/kg) 60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注 生食 250mL	mg	Day1	90分
	2回目以降	<input type="checkbox"/> トラスツズマブBS:6mg/kg <input type="checkbox"/> (ハーセプチン:6mg/kg) 60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注 生食 250mL	mg	Day1	下記参照
	プレメディ	5-HT3R拮抗剤+プロイモント+デキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分
	②	ドセタキセル:75mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖 250mL	mg	Day1	1時間
③	カルボプラチン:AUC(6) 5%ブドウ糖 250mL	mg	Day1	1時間	

◆トラスツズマブ(ハーセプチン)の投与法は、引用文献ではweekly投与となっているが、ガイドライン処方例に準じてtriweeklyで登録。  
 ◆トラスツズマブ(ハーセプチン)は初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる。  
 ◆カルボプラチン投与量 = AUC(6) × (Ccr+25)

佐賀大学医学部附属病院