

非小細胞肺癌-76

非小細胞肺癌における術前補助療法(非扁平上皮癌)

【術前補助】オプジーボ+ペトレキセド+カルボプラチン併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース:21日間 コース数:最大3回 《開始時基準 PS:0~1、年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—	
①	オプジーボ:360mg/body	mg	Day1	30分	
	生食 100mL				
フラッシュ	オプジーボ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ				
プレメディ(点滴)	NK1-R拮抗剤+5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分	
②	ペトレキセド:500mg/m²	mg	Day1	10分	
	生食 70mL				
③	カルボプラチン:AUC(5)	mg	Day1	1時間	
	5%ブドウ糖液 250mL				
<p>◆オプジーボ投与時の総液量は、体重30kg以上の患者では総液量を150mL以下とする。</p> <p>◆オプジーボ投与時の総液量は、体重30kg以上の患者では総液量を150mL以下とする。</p> <p>※体重30kg未満の患者では、総液量を100mL以下とするため、生食50mL(100mLボトル)に希釈する。</p> <p>◆ペトレキセド初回投与7日以上前から1日1回パンビタン1gを連日経口投与。(ペトレキセド中止3週間後まで)</p> <p>◆ペトレキセド初回投与7日以上前に、シアノコバラミン(1mg/1A)筋肉内投与。以後9週間毎投与。 (ペトレキセド中止3週間後まで)</p> <p>◆カルボプラチン投与量 = $AUC(5) \times (Cr+25)$ Cr算出:Cockcroft-Gault式</p>					

佐賀大学医学部附属病院