

進行又は再発の子宮頸癌
キイトルーダ+パクリタキセル+シスプラチン併用療法 患者プロトコル

催吐リスク
高度
放射線併用なし

投与プロトコル 1コース:21日間 コース数 パクリタキセル、シスプラチン:最大6コース キイトルーダ:最大35コース 《開始時基準 PS:0~1、年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
【3剤併用療法】1~最大6コース目					
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—	
①	キイトルーダ: 200mg/body	mg	Day1	30分	
	生食 100mL				
フラッシュ	キイトルーダ投与後、ルートキープ用生食でフラッシュ				
プレメディ	硫酸マグネシウム8mEq+生食100mL		Day1	30分	
	レスタミン	5錠	Day1	30分前	
	NK1受容体拮抗薬		Day1~	30分前	
	5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+H2R拮抗剤+生食100mL		Day1	30分	
②	パクリタキセル: 175mg/m ²	mg	Day1	3時間	
	ソルデム3A 500mL				
③	シスプラチン: 50mg/m ²	mg	Day1	2時間	
	生食 300mL				
ハイドレーション	輸液等(ソルデム3A等)		Day1~	—	
【3剤併用療法終了後】3剤併用療法期間を含め、キイトルーダ:最大35回					
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1	—	
①	キイトルーダ: 200mg/body	mg	Day1	30分	
	生食 100mL				

佐賀大学医学部附属病院