

治癒切除不能な胆道癌

イミフィンジ+ジェムザール+シスプラチン併用療法 患者プロトコール

催吐リスク
中等度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース 21日間 最大8コース 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL		Day1,8		
①	イミフィンジ: 1500mg/body	mg	Day1	1時間	
	<input type="checkbox"/> 体重30kg以下: 20mg/kg				
	生食 100mL				
フラッシュ	イミフィンジ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ				
ハイドレーション	ソルデム3A 500mL		Day1,8	90分	* 制吐剤は患者の状態に応じて投与を検討
プレメディ	NK1受容体拮抗薬*		Day1~8~	30分	
	5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1,8		
②	シスプラチン: 25mg/m <sup>2</sup>	mg	Day1,8	1時間	
	生食 250mL				
③	ジェムザール: 1000mg/m <sup>2</sup>	mg	Day1,8	30分	
	5%ブドウ糖 100mL				
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュ				

佐賀大学医学部附属病院