

投与プロトコール 1コース 21日間 コース制限なし 《開始時基準 PS:0〜1・年齢:18歳以上》			投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep		生食 500ml	—	Day1	—	
①	初回	フェスゴ配合皮下注 IN (15mL)		Day1	皮下注射	8分かけて 大腿部に投与 (前面又は側面)
		<有効成分> 以下に各有効成分の投与量を記載				
		ペルツズマブ : 1200mg/body	mg			
		トラスツズマブ : 600mg/body	mg			
		(ホルヒアルロニダーゼ [®] アルファ: 30,000U)	—	詳細は電子添文参照		
経過観察		フェスゴ投与終了後、Infusion reactionの発現がないことを確認してから、次の薬剤を投与する。 初回は30分の経過観察を行い、2回目以降は15分まで短縮可能。(30分)				
②	2回目以降	フェスゴ配合皮下注 MA (10mL)		Day1	皮下注射	5分かけて 大腿部に投与 (前面又は側面)
		<有効成分> 以下に各有効成分の投与量を記載				
		ペルツズマブ : 600mg/body	mg			
		トラスツズマブ : 600mg/body	mg			
		(ホルヒアルロニダーゼ [®] アルファ: 20,000U)	—	詳細は電子添文参照		
経過観察		フェスゴ投与終了後、Infusion reactionの発現がないことを確認してから、次の薬剤を投与する。 初回は30分の経過観察を行い、2回目以降は15分まで短縮可能。(15分)				
プレメディ		5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1	30分	
③	ドセタキセル: 75mg/m ²		mg	Day1	1時間	
	5%ブドウ糖 250mL					

佐賀大学医学部附属病院