

乳癌-65

HER-2 陽性乳癌

【周術期】パージェタ+トラスツズマブBS(ハーセプチン)+

weeklyパクリタキセル(HP+wPTX)併用療法 患者プロトコール

催吐リスク

軽度

放射線併用なし

| 投与プロトコール 1コース:21日間                                                                      |                                                            | 投与量                                                                                                                                                                   | 投与日       | 投与時間 | 備考     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| コース数 HP+wPTX療法:術前または術後に最大4コース<br>HP療法:HP+wPTX療法投与期間含め最長12ヶ月間<br>《開始時基準 PS:0~1・年齢:18歳以上》 |                                                            |                                                                                                                                                                       |           |      |        |
| 【HP+wPTX療法】術前または術後に最大4コース目                                                              |                                                            |                                                                                                                                                                       |           |      |        |
| ルートKeep                                                                                 | 生食 500mL                                                   | —                                                                                                                                                                     | Day1,8,15 | —    |        |
| ①                                                                                       | 初回                                                         | パージェタ:840mg/body<br>生食 250mL                                                                                                                                          | mg        | Day1 | 60分    |
|                                                                                         | 2回目以降                                                      | パージェタ:420mg/body<br>生食 250mL                                                                                                                                          | mg        | Day1 | 電子添文参照 |
| 経過観察                                                                                    |                                                            | パージェタ投与終了後、Infusion reactionの発現がないことを確認してから、次の薬剤を投与する。                                                                                                                |           |      |        |
| ②                                                                                       | 初回                                                         | <input type="checkbox"/> トラスツズマブBS:8mg/kg<br><input type="checkbox"/> (ハーセプチン:8mg/kg)<br>60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解<br>(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注<br>生食 250mL | mg        | Day1 | 90分    |
|                                                                                         | 2回目以降                                                      | <input type="checkbox"/> トラスツズマブBS:6mg/kg<br><input type="checkbox"/> (ハーセプチン:6mg/kg)<br>60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解<br>(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注<br>生食 250mL | mg        | Day1 | 電子添文参照 |
| 経過観察                                                                                    |                                                            | ハーセプチン投与終了後、Infusion reactionの発現がないことを確認してから、次の薬剤を投与する。                                                                                                               |           |      |        |
| プレメディ(内服)                                                                               | セレスタミン                                                     | 1錠                                                                                                                                                                    | Day1,8,15 | 30分前 |        |
| プレメディ(注射)                                                                               | 5-HT <sub>3</sub> R拮抗剤+デキサメタゾン+H <sub>2</sub> R拮抗剤+生食100mL |                                                                                                                                                                       | Day1,8,15 | 30分  |        |
| ③                                                                                       | パクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup><br>5%ブドウ糖250mL                 | mg                                                                                                                                                                    | Day1,8,15 | 60分  |        |
| 【HP療法】HP+wPTX療法投与期間含め最長12ヶ月間                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                       |           |      |        |
| ルートKeep                                                                                 | 生食 500mL                                                   | —                                                                                                                                                                     | Day1      | —    |        |
| ①                                                                                       | 初回                                                         | パージェタ:840mg/body<br>生食 250mL                                                                                                                                          | mg        | Day1 | 60分    |
|                                                                                         | 2回目以降                                                      | パージェタ:420mg/body<br>生食 250mL                                                                                                                                          | mg        | Day1 | 電子添文参照 |
| 経過観察                                                                                    |                                                            | パージェタ投与終了後、Infusion reactionの発現がないことを確認してから、次の薬剤を投与する。                                                                                                                |           |      |        |
| ②                                                                                       | 初回                                                         | <input type="checkbox"/> トラスツズマブBS:8mg/kg<br><input type="checkbox"/> (ハーセプチン:8mg/kg)<br>60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解<br>(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注<br>生食 250mL | mg        | Day1 | 90分    |
|                                                                                         | 2回目以降                                                      | <input type="checkbox"/> トラスツズマブBS:6mg/kg<br><input type="checkbox"/> (ハーセプチン:6mg/kg)<br>60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解<br>(溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注<br>生食 250mL | mg        | Day1 | 電子添文参照 |

佐賀大学医学部附属病院