

乳癌-64

HER-2 陽性乳癌【進行・再発】

パージェタ+トラスツマブBS(ハーセプチン)+weeklyパクリタキセル(HP+wPTX)併用療法  
患者プロトコール

催吐リスク
軽度
放射線併用なし

投与プロトコール 1コース:21日間 コース数:制限なし 《開始時基準 PS:0~1・年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与	備考
ルートKeep	生食 500mL	—	Day1,8,15	—	
①	初回 パージェタ:840mg/body 生食 250mL	mg	Day1	60分	
	2回目以降 パージェタ:420mg/body 生食 250mL	mg	Day1	電子添文参照	
経過観察	初回は30分の経過観察を行い、2回目以降は様子を見て短縮可能。				
②	初回 <input type="checkbox"/> トラスツマブBS:8mg/kg <input type="checkbox"/> (ハーセプチン:8mg/kg) 60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解 (溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注 生食 250mL	mg	Day1	90分	
	2回目以降 <input type="checkbox"/> トラスツマブBS:6mg/kg <input type="checkbox"/> (ハーセプチン:6mg/kg) 60mg/Vを注射用水3mL、150mg/Vを注射用水7.2mLで溶解 (溶解液濃度21mg/mL)し、必要量を下記に混注 生食 250mL	mg	Day1	電子添文参照	
経過観察	初回は30分の経過観察を行い、2回目以降は様子を見て短縮可能。				
プレメディ(内服)	セレスタミン	1錠	Day1,8,15	30分前	
プレメディ(注射)	5-HT <sub>3</sub> R拮抗剤+デキサメタゾン+H <sub>2</sub> R拮抗剤+生食100mL		Day1,8,15	30分	
③	パクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖250mL	mg	Day1,8,15	60分	

佐賀大学医学部附属病院