

投与プロトコール 1コース:21日間 コース制限なし 《開始時基準 PS:0~1、年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生食 500mL	-	Day1,8	-	
① 初回	フェスゴ配合皮下注 IN (15mL)		Day1	皮下注射	8分かけて 大腿部に投与 (前面又は側面) 詳細は、電子添文参照
	<有効成分> 以下に各有効成分の投与量を記載				
	ペルツズマブ :1200mg/body トラスツズマブ :600mg/body (ホルヒアルロニダーゼ アルファ:30,000U)	mg mg -			
経過観察	フェスゴ投与終了後、Infusion reactionの発現がないことを確認してから、次の薬剤を投与する。 初回は30分の経過観察を行い、2回目以降は15分まで短縮可能。(30分)				
② 2回目以降	フェスゴ配合皮下注 MA (10mL)		Day1	皮下注射	5分かけて 大腿部に投与 (前面又は側面) 詳細は、電子添文参照
	<有効成分> 以下に各有効成分の投与量を記載				
	ペルツズマブ :600mg/body トラスツズマブ :600mg/body (ホルヒアルロニダーゼ アルファ:20,000U)	mg mg -			
経過観察	フェスゴ投与終了後、Infusion reactionの発現がないことを確認してから、次の薬剤を投与する。 初回は30分の経過観察を行い、2回目以降は15分まで短縮可能。(15分)				
③	ロゼウス:25mg/m²	mg	Day1,8	全開	
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュする				

佐賀大学医学部附属病院