

投与プロトコル 1コース 42日間		投与量	投与日	投与時間	備考
キイトルーダ:最大18コース、シスプラチン:最大4コース、ジェムザール:制限なし 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》					
<b>【3剤併用療法】最大4コース</b>					
ルートKeep	生食 500mL		Day1,8,22,29	—	
①	キイトルーダ:400mg/body (ペムプロリズマブ) 生食 100mL	mg	Day1	30分	
フラッシュ	キイトルーダ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ				
ハイドレーション	ソルデム3A 500mL		Day1,8,22,29	90分	
プレメディ	NK1R拮抗薬+5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1,8,22,29	30分	
②	シスプラチン: 25mg/m <sup>2</sup> 生食 250mL	mg	Day1,8,22,29	1時間	
③	ジェムザール:1000mg/m <sup>2</sup> (ゲムシタビン) 5%ブドウ糖 100mL	mg	Day1,8,22,29	30分	
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュ				
<b>【3剤併用療法終了後】3剤併用療法期間も含め、キイトルーダ:最大18コース、ジェムザール:制限なし</b>					
ルートKeep	生食 500mL		Day1,8,22,29	—	
①	キイトルーダ:400mg/body (ペムプロリズマブ) 生食 100mL	mg	Day1	30分	
フラッシュ	キイトルーダ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ				
プレメディ	デキサメタゾン+生食100mL		Day1,8,22,29	30分	
②	ジェムザール:1000mg/m <sup>2</sup> (ゲムシタビン) 5%ブドウ糖 100mL	mg	Day1,8,22,29	30分	
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュ				

佐賀大学医学部附属病院