

投与プロトコール 1コース:21日間 術前又は術後4コース 《開始時基準 PS:0～1・年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep 生食 500ml		－	Day1,8,15	－	
①	初回	フェスゴ配合皮下注 IN (15mL)		Day1	皮下注射 8分かけて 大腿部に投与 (前面又は側面) 詳細は、電子添文参照
		<有効成分> 以下に各有効成分の投与量を記載			
		ペルツズマブ :1200mg/body	mg		
		トラスツズマブ :600mg/body (ホルヒアルロニダーゼ [®] アルファ:30,000U)	mg －		
経過観察		フェスゴ投与終了後、Infusion reactionの発現がないことを確認してから、次の薬剤を投与する。 初回は30分の経過観察を行い、2回目以降は15分まで短縮可能。(30分)			
②	2回目以降	フェスゴ配合皮下注 MA (10mL)		Day1	皮下注射 5分かけて 大腿部に投与 (前面又は側面) 詳細は、電子添文参照
		<有効成分> 以下に各有効成分の投与量を記載			
		ペルツズマブ :600mg/body	mg		
		トラスツズマブ :600mg/body (ホルヒアルロニダーゼ [®] アルファ:20,000U)	mg －		
経過観察		フェスゴ投与終了後、Infusion reactionの発現がないことを確認してから、次の薬剤を投与する。 初回は30分の経過観察を行い、2回目以降は15分まで短縮可能。(15分)			
プレメディ(内服)		セレスタミン	1錠	Day1,8,15	30分前
プレメディ(注射)		5-HT ₃ R拮抗剤＋デキサメタゾン＋H ₂ R拮抗剤＋生食100mL		Day1,8,15	30分
③	パクリタキセル:80mg/m ²		mg	Day1,8,15	1時間
	5%ブドウ糖 250mL				