

再発または難治性の多発性骨髄腫(標準治療が困難な場合に限る)  
エルレフィオ単剤療法 患者プロトコル

催吐リスク

軽度

放射線併用なし

| 投与プロトコル<br>1コース:電子添文参照 コース数:制限なし<br>《開始時基準 PS:0~2・年齢:18歳以上》 |                                                                                | 投与量 | 投与日                   | 投与時間 | 備考        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------|-----------|
| ステップアップ用量① 1コース:3日間(1コース後はステップアップ用量②へ)                      |                                                                                |     |                       |      |           |
| プレメディ(内服)                                                   | 副腎皮質ホルモン剤 + 抗ヒスタミン剤 + 解熱鎮痛剤<br>(デキサメタゾン20mg相当+ジフェンヒドラミン25mg相当+アセトアミノフェン1000mg) |     | Day1                  | 1時間前 | 詳細は電子添文参照 |
| ①                                                           | エルレフィオ:12mg/body                                                               | mg  | Day1                  | 皮下注射 |           |
| 44mgバイアルから0.3mLを採液                                          |                                                                                |     |                       |      |           |
| ステップアップ用量② 1コース:4日間(1コース後は標準療法①へ)                           |                                                                                |     |                       |      |           |
| プレメディ(内服)                                                   | 副腎皮質ホルモン剤 + 抗ヒスタミン剤 + 解熱鎮痛剤<br>(デキサメタゾン20mg相当+ジフェンヒドラミン25mg相当+アセトアミノフェン1000mg) |     | Day1                  | 1時間前 |           |
| ①                                                           | エルレフィオ:32mg/body                                                               | mg  | Day1                  | 皮下注射 |           |
| 44mgバイアルから0.8mLを採液                                          |                                                                                |     |                       |      |           |
| 標準用量① 1コース:7日間(コース数:制限なし)                                   |                                                                                |     |                       |      |           |
| プレメディ(内服)                                                   | 副腎皮質ホルモン剤 + 抗ヒスタミン剤 + 解熱鎮痛剤<br>(デキサメタゾン20mg相当+ジフェンヒドラミン25mg相当+アセトアミノフェン1000mg) |     | 前回32mg投与後の<br>76mg投与時 | 1時間前 |           |
| ①                                                           | エルレフィオ:76mg/body                                                               | mg  | Day1                  | 皮下注射 |           |
| 76mgバイアルから1.9mLを採液                                          |                                                                                |     |                       |      |           |

初回投与日から24週以上投与し、奏効が認められている場合は、  
標準療法①→標準療法②(1コース14日間)とすること。

|                                   |                                                                                |    |                       |      |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|------|--|
| <b>標準用量② 1コース:14日間(コース数:制限なし)</b> |                                                                                |    |                       |      |  |
| プレメディ(内服)                         | 副腎皮質ホルモン剤 + 抗ヒスタミン剤 + 解熱鎮痛剤<br>(デキサメタゾン20mg相当+ジフェンヒドラミン25mg相当+アセトアミノフェン1000mg) |    | 前回32mg投与後の<br>76mg投与時 | 1時間前 |  |
| ①                                 | エルレフィオ:76mg/body<br>76mgバイアルから1.9mLを採液                                         | mg | Day1                  | 皮下注射 |  |

## 【投与延期後の再開時について】

※副作用等の理由による休薬後にエルレフィオを再開する場合、  
再開時投与量・投与間隔については電子添文および適正使用ガイド等を確認すること。

|                                         |                                                                                |    |      |      |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--|
| <b>休薬後の再開用量① 1コース:7日間(1コース後は標準療法①へ)</b> |                                                                                |    |      |      |  |
| プレメディ(内服)                               | 副腎皮質ホルモン剤 + 抗ヒスタミン剤 + 解熱鎮痛剤<br>(デキサメタゾン20mg相当+ジフェンヒドラミン25mg相当+アセトアミノフェン1000mg) |    | Day1 | 1時間前 |  |
| ①                                       | エルレフィオ:32mg/body<br>44mgバイアルから0.8mLを採液                                         | mg | Day1 | 皮下注射 |  |

佐賀大学医学部附属病院